



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Olecku

**Szanowni Państwo
właściciele stad świń w powiecie oleckim.**

W związku ze stwierdzeniem obecności wirusa w zwłokach 80 padłych z powodu afrykańskiego pomoru świń dzików w okresie od listopada 2018r. do połowy stycznia 2019r. na terenie gmin Świętajno i Kowale Oleckie, a więc niewątpliwą obecnością i krążeniem czynnika zakaźnego na terenie całego powiatu oleckiego i wszystkich sąsiednich, **gorąco apeluję** o przestrzeganie poniższych zasad i życzliwe rozważenie wykonalności zalecenia z punktu 8 niniejszego wystąpienia.

Wystąpienie to oparte jest na doświadczeniach z przypadków zawleczenia wirusa afrykańskiego pomoru świń od dzików do gospodarstw utrzymujących świnie, w szczególności w województwach podlaskim i lubelskim.

1. Z chwilą rozpoczęcia wiosennych prac na gruntach ornych, użytkach zielonych i zasadzeniach leśnych bezwzględnie wykonywać czyszczenie i dezynfekcję maszyn i sprzętu, możliwie jeszcze przed wjazdem na teren gospodarstwa, w szczególności w oddaleniu od chlewni.
2. Ubrania używane do prac polowych i oddzielne do obrządzania świń prac z użyciem standardowych detergentów, możliwie po każdym użyciu i zabrudzeniu w temp. 60 ° C przez co najmniej pół godziny. Do chlewni przeznaczyć oddzielne obuwie robocze, starannie czyszczone i dezynfekowane przed- i po każdym użyciu.
3. Maty lub niecki dezynfekcyjne wjazdowe/wyjazdowe i wejściowe/wyjściowe utrzymywać w stanie aktywności, zmieniając i uzupełniając roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych.
4. Toaletę, w szczególności odkrytych części ciała (twarz, dłonie) wykonywać każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac w chlewni.
5. Uzupełnić i zachować szczelność budynków w których utrzymywane są świnie, a także pomieszczeń na paszę i ściółkę.
6. Uniemożliwić dostęp zwierząt domowych, w szczególności psów utrzymywanych w wolnym dostępie do pól, lasów i użytków zielonych.
7. Wyeliminować zielonkę z żywienia świń, zaś ziarno skarmiać, a słomę wykorzystywać na ściółkę wyłącznie po odpowiednio jedno i trzymiesięcznym składowaniu po zbiorach, z uniemożliwionym dostępem dzików.
8. Do właścicieli niewielkich stad świń, utrzymywanych najczęściej wyłącznie na użytek własny, **gorąco apeluję** o „wygaszenie” chowu na okres wiosny, lata i wczesnej jesieni. Po ominięciu tych najbardziej ryzykownych pór roku do zawleczenia zarazy uważam, że możliwe będzie ekologiczne dotuczenie na okres obu Świąt warchlaków i lekkich tuczników zakupionych z legalnych, nadzorowanych i właściwie zabezpieczonych stad. W stadach takich dodatkowo prowadzone są badania laboratoryjne wykluczające obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Z uszanowaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Olecku

lek.wet. Dariusz Jaluś

